

## BIRS

### **Birs környezeti igényei:**

A termesztését legjobban meghatározó környezeti tényező a hőmérséklet, kimondottan kedveli a meleget, melegigényes növény. A nyári időszakban gyakran előforduló forróságok jobban tűri, mint a hideget. A téli lehűlések tekintetében az almához és a körtéhez viszonyítva is érzékenyebb, -25C alatt komoly sérüléseket szenvedhet, azonban viszonylag könnyen regenerálódik. A téli időszakban a hideg szelek is károsíthatják, ezért célszerű szélvédett helyekre ültetni. Viszonylag későn virágzik, ezért a késő tavaszi fagyok csak ritkán károsítják a virágait. Telepítéséhez a legalkalmasabbak a középkötött, homokos, levegős agyagtalajok, amelyek tápanyagokban, humuszban gazdagok és könnyen fölmelegednek, ugyanakkor nem sok meszet tartalmaznak. Száraz, meszes körülmények között a gyümölcse elaprózódik és kövecses lesz. A birs számára fontos a vízellátottság, megfelelő mennyiségű termés eléréséhez hazánkban öntözni kell.

**Termékenyülés:** A birs virágai az egy és többéves vesszőkön, gallyakon található hajtások csúcán jelennek meg, ahol vegyes rügyből fejlődnek ki, ezért nem szabad a birs termővesszeit visszametszeni. A levelek kihajtása után 4-8 apró leveles állapotban jelennek meg a nagyméretű, látványos virágai. A birs kis részben öntermékenyül az évjáráttól és a termőhelytől függően. a biztonságos terméskötődéshez azonban porzófajta javasolt!

**Alanyok:**EM-A: Középerős növekedésű, érzékeny a mézre és a szárazságra

### **Bereczki bőtermő**

Szeptember végétől október közepéig szedhető. Körte formájú gyümölcse nagy, vagy igen nagy. (300-500 g). Fedőszíne narancssárga, húsa fehéressárga, közepesen lédús. A legízletesebb, legillatosabb birs fajta. Nagyon korán termőre fordul. Jó a tél és szárazságtűrése. Pollenadói: AngersiChampion, Konstantinápolyi.

### **Bereczki birs**

Szeptember közepén- október elején érik, Megnyúlt körte alakú gyümölcse nagy, vagy igen nagy. (300-500 g). Fedőszíne aranyárga, húsa fehéressárga, gyengén leves, néha kövecses. Íze édeskés, erősen illatos. Magvaji nagyok. Ivóleve közepes, befőttje kiváló. Nagyon korán termőre fordul. Jó a tél és szárazságtűrése. Pollenadói: AngersiChampion, Mezőtúri

### **Konstantinápolyi**

Október elejétől végéig szedhető. Közepes méretű, kerek gyümölcseinek héja erősen bordázott, felülete molyhos, sárgászöld vagy sárga. Gyümölcshúsa fehéres sárga, lédús, édes-savas. Fiatal korban erős, később mérséklődik a fa növekedése. Jó télálló a tavaszi fagyok kevésbé károsítják. Jó termőképességű, korán termőre fordul, rendszeresen terem. Pollenadói: Angersi, Bereczki bőtermő, Champion.