

Őszibarack

Őszibarack környezeti igényei:

Hazánkban a termesztetőségének északi határán helyezkedik el. A termesztését leginkább korlátozó tényező a téli időszak hőmérséklet viszonyai. A téli tartós hideghatás a rügyeket és a növényt is veszélyezteti, a mélynyugalom megszakításához szüksége hideghatás nélkül viszont a virágrügyképzés kerül veszélybe. A -10 C körüli hideget még gyengébb állapotú őszibarack fák is gond nélkül túlélnek, a -20 C alatt azonban az erős, egészséges fák is károsodhatnak. Rövid ideig tartó erősebb hideget még képes elviselni. Hazánkban a hosszú mélynyugalmi idejű fajtákat célszerű ültetni. Bimbózás, virágzás állapotában rendszeresen a tavaszi fagykarak. Bár látszólag jól bírja a szárazságot a tápanyagfelvételhez és a megfelelő termés eléréséhez azonban szükséges az öntözése. Sokféle talajon termesztető, megfelelő eredményhez azonban jó vízgazdálkodású, tápanyagban, humuszban gazdag talaj szükséges. Növekedéséhez szükséges a megfelelő kalcium és kálium tartalom, viszont a túl sok kalcium gátolja a kálium felvételét.

Termékenyülés: Az őszibarack fajták nagyrészeöntermékeny, az öntermékenyülés aránya a legmagasabb a csonthéjasok között.

Alanyok: Vadőszibarack: az összes őszibarack és nektarin fajtával kompatibilis, középérs vagy erős oltványokat ad. Klorózisra érzékeny, a 7%-nál magasabb mésztartalmú területekre nem javasolt. Laza de jó vízellátottságú talajokat kedvel.

Keserűmandula: A nemes őszibarackfajtákkal jól összeillik, az oltványok középérsesek lesznek. Meszes, száraz, köves talajokon is megél. A vadőszibaracknál melegigényesebb, annál valamivel kevésbé télálló.

Champion (fehér húsú őszibarack)

Augusztus közepén, második felében érik. Friss fogyasztásra és gyümölcsle gyártására kiváló. Gyümölcse nagyméretű, gömbölyű alakú, bibepontja kiemelkedik. Héja éretten sárgásfehér, erősen molyhos, helyenként piros bemosódás borítja. Húsa fehér, bőlevű, magvaváló, kiváló ízű. Termőképessége jó, hazánkban mindenhol ültethető.

Elberta (sárga húsú őszibarack)

Augusztus utolsó napjaiban, szeptember elején érik. Nagy, középnagy gyümölcsei enyhén lapított gömb alakúak, erősen molyhosak. Héja vastag, zöldessárga, piros bemosódásokkal. Húsa narancssárga, kemény bőlevű, magvaváló. Fája erős növekedésű. Közepes termőképességű, téli hidegekre érzékeny.

Ford (fehér húsú őszibarack)

Augusztus első hetében szedhető. Középnagy gyümölcsei erősen molyhosak, zöldessárga alapszínűek, csak kis felületen színeződnek pirosra. Húsa félmagvaváló, zöldessárga, jó ízű. Erős növekedésű fája terebélyes koronát nevel. Jó termőképességű biztonsággal terem, jól bírja a hidegeket.

IncrocioPieri (fehér húsú őszibarack)

Augusztus közepén érik. Nagyméretű gyümölcse gömb alakú. Gyümölcshéja sárgásfehér alapon liláspiros fedőszínnel borított. Húsa zöldesfehér, bőlevű, magvaváló, jó ízű. Fája középérs növekedésű. Jó termésbiztonságú fajta.

Mariska (fehér húsú őszibarack)

Korán, július közepén érik. Középnagy gyümölcse enyhén lapított gömb alakú. Héja sárgászöld, piros fedőszínnel csíkozott. Húsa fehér, lédús, félmagvaváló, zamatos, jó ízű. Fája erős növekedésű, megbízhatóan terem, jól bírja a hideget.

Redhaven (sárga húsú őszibarack)

Július utolsó napjaiban, augusztus elején érik. Közepesen nagy, vagy nagy lapított gömb alakú gyümölcsének héja sárga, piros fedőszínnel borított. Húsa sárga, belső részein vöröses, közepes keménységű, magvaváló. Fája középerős növekedésű, jó termőképességű, jól bírja a lehűléseket.

Remény (Kínai lapos barack, fehér húsú)

Augusztus elején-közepén szedhető. Közepes méretű gyümölcse erősen lapított, pogácsa alakú. Héja zöldesfehér a nap felőli oldalon pirossal mosott. Húsa zöldesfehér, fehér, a mag körül pirosodó, édes, zamatos, nagyon jó ízű. Fája középerős növekedésű, jó termőképességű.

Creshaven (sárga húsú őszibarack)

Augusztus végén, szeptember elején szedhető nagyméretű, gömb alakú gyümölcsei. Héja közepesen molyhos, sárga alapszínen vörös fedőszín borítja. Húsa sárga, a mag körül vörösödő, kemény, magvaváló, jó ízű. Fája középerős növekedésű, közepes termőképességű, érzékeny a téli lehűlésekre.

Forrás: Hegedűs András *Gyümölcs és szőlőfajták (BP. MAKERT)*